

Schnittkalender

Die Übersicht enthält, neben den im Heft beschriebenen, noch weitere Gehölze. Bei „Schnitt“ wird, wo möglich, auf ähnliche Arten verwiesen

Name <i>Botanischer Name</i>	Schnittzeitpunkt	Schnitt	Seite im Heft
Ahorn, Fächer- <i>Acer palmatum</i>	Juni–September	Schnittempfindlich, zurückhaltend schneiden. Nach innen wachsende Triebe auslichten. Nie einkürzen (> Zaubernuss)	19
Apfel <i>Malus domestica</i>	Januar–März Juli–September	Erziehung jährlich im Frühjahr. Auf stabilen Gerüstaufbau achten. Zweijährige Fruchttriebe fördern, vergreiste Spitzen umlenken	46–49
Aprikose <i>Prunus armeniaca</i>	April–September	Erziehungsschnitt nach der Blüte, Erhaltungsschnitt immer im Sommer. Einjährige Triebe von 10–15 cm als Fruchtholz fördern	51
Azalee <i>Azalea</i> -Arten	Mai–Juni	Kein jährlicher Schnitt. Vergreiste Triebe nach der Blüte auf kurze Zapfen zurückschneiden. Verblühtes ausbrechen (> Rhododendron)	26
Bartblume <i>Caryopteris x clandonensis</i>	März–April	Schnitt jährlich direkt vor dem Austrieb. Zweijährige und ältere Triebe bodeneben entfernen, einjährige auf 5–10 cm einkürzen	25
Berberitze, Sauerdorn <i>Berberis</i> -Arten	April–Juni	Jährlicher Schnitt nach der Blüte vorteilhaft. 10–15 Bodentriebe, nach 5 Jahren ersetzen. Vergreiste Spitzen umlenken (> Felsenbirne)	19
Besenginster <i>Cytisus scoparius</i>	Mai–Juni	Jährlicher Schnitt nach der Blüte. Einjährige Triebe auf 10–20 cm einkürzen: Ältere bodennah auslichten. Nicht ins alte Holz schneiden	-
Birne <i>Pyrus communis</i>	Januar–März Juli–September	Erziehung und Schnitt wie bei Apfel. Zweijährige Triebe als bevorzugte Fruchttriebe fördern. Steiltriebe jährlich entfernen	49
Blasenspiere <i>Physiocarpus opulifolius</i>	Mai–Juni	Jährlicher Schnitt nach der Blüte. 5–7 Gerüsttriebe, vergreiste auslichten. Verzweigte Triebspitzen umlenken (> Schneeball)	19
Blauraute <i>Perovskia abrotanoides</i>	März–April	Jährlich später Schnitt, Zwei- und mehrjährige Triebe bodeneben entfernen. Einjährige Triebe auf 5 cm kurze Zapfen einkürzen	25
Blauregen <i>Wisteria</i> -Arten	März–April Juni–August	Jährlicher Schnitt im Frühjahr und Sommer. Gerüsttriebe an Rankhilfe binden. Blüentriebe zweimal jährlich stark einkürzen	39
Blutjohannisbeere <i>Ribes sanguineum</i>	April–Mai	Jährlicher Schnitt nach der Blüte. Bis 10 Gerüsttriebe, diese nach 5 Jahren ersetzen. Triebspitzen umlenken (> Forsythie)	-
Blutpflaume <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	April–Mai Juni–September	Nach der Blüte schneiden, Verjüngung nur im Sommer. Stabiles Gerüst. Steiltriebe auslichten. Triebspitzen verschlanken (> Bäume)	30
Brombeere <i>Rubus fruticosus</i>	März–April Juli–September	Schnitt jährlich. Abgetragene Ruten im Sommer entfernen. Neue Ruten im Frühjahr auf 3 m einkürzen, Seitentriebe auf Zapfen	57
Buchs <i>Buxus</i> -Arten	März–Juli	Nur bei Formschnitt jährlich. Frei wachsende Sträucher zurückhaltend auslichten, vergreiste im späten Frühjahr stark zurückschneiden	26 29
Clematis (Frühsommer) <i>Clematis</i> -Sorten	März–April	Jährlicher Schnitt vor dem Austrieb. Ganze Pflanze um ein Viertel bis ein Drittel einkürzen. Vorsicht: verholzte Triebe brechen leicht	41
Clematis (früh) <i>Clematis</i> -Arten	April–Mai	Wenn bei Vergreisung Schnitt notwendig, dann nach der Blüte. Verjüngungsschnitt auf die Hälfte, ältere Triebe trocknen oft zurück	41
Clematis (Sommer) <i>Clematis</i> -Sorten	März–April	Jährlicher Schnitt im Frühjahr vor der Blüte. Ganze Pflanze auf 30–50 cm einkürzen. Nur starker Schnitt bringt lange Blütezeit	40
Deutzie <i>Deutzia</i> -Arten	Mai–Juni	Jährlicher Schnitt nach der Blüte. 7–12 Bodentriebe, diese nach 4 Jahren ersetzen. Verzweigungen regelmäßig umlenken (> Spiräe)	18

wichtiger Gehölze

Name <i>Botanischer Name</i>	Schnittzeitpunkt	Schnitt	Seite im Heft
Efeu <i>Hedera</i> -Arten	März–April	Schnitt nur, wenn Efeu zu groß wird oder überlang von der Wand absteht. Blütentriebe wandnah umlenken. Dachränder frei halten	42
Eibe <i>Taxus</i> -Arten	März–April Juni–August	Nur bei Formgehölzen jährlicher Schnitt. Frei wachsende bei Bedarf auslichten. Schnitt in das alte Holz ist ebenfalls möglich	28
Feige <i>Ficus carica</i>	April–Mai Juni–August	Schnitt jährlich im Frühjahr, auslichten im Sommer. Einjährige Triebe von 15–40 cm fördern, nur sie tragen die erste Ernte im Jahr	51
Felsenbirne <i>Amelanchier</i> -Arten	April–Mai	Schnitt bei Bedarf nach der Blüte. Bildet stabiles Gerüst aus. Triebspitzen regelmäßig vereinzeln. Steiltriebe im Innern auslichten	19
Fichte <i>Picea</i> -Arten	März–Juli	Bei Bedarf nach dem Austrieb bis Sommer schneiden. Nicht sehr schnittverträglich. Nur im benadelten Bereich schneiden (> Thuja)	27
Flieder <i>Syringa vulgaris</i>	März–April Mai–Juni	Bei Bedarf vor der Blüte verjüngen. Nach innen wachsende Triebe regelmäßig auslichten, Verblühtes jährlich entfernen (> Zaubernuss)	19
Forsythie <i>Forsythia x intermedia</i>	April–Mai	Jährlicher Schnitt nach der Blüte. 10–12 Bodentriebe, diese nach spätestens 4 Jahren ersetzen. Spitzen verschlanken	18
Fünffingerstrauch <i>Potentilla fruticosa</i>	März–April	Jährlich zweijährige und ältere Triebe bodeneben auslichten. Einjährige mindestens die Hälfte einkürzen. Alte Gehölze auf Stock setzen	23
Geißblatt, Schlingendes <i>Lonicera</i> -Arten	März–April Juli–August	Bei Bedarf dichte Knäuel an den Spitzen bis zum Gerüst vollständig entfernen. Überhängende Triebe im Sommer einkürzen	43
Gewürzsalbei <i>Salvia officinalis</i>	April–Mai Juli	Jährlich, beim Austrieb, ältere Triebe bodennah auf Seitenknospen einkürzen. Verblühte Triebe bodennah umlenken	24
Hainbuche <i>Carpinus betulus</i>	Februar–August	Nur formale Hecken jährlich ein- bis zweimal schneiden. Bei frei wachsende Gehölze kein regelmäßiger Schnitt (> Bäume, Hecken)	29 30
Hartriegel, Rotrindiger <i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	März–April	Jährlicher Schnitt vor dem Austrieb. Zweijährige und ältere Triebe bodeneben auslichten. Einjährige nicht einkürzen	12
Haselnuss <i>Corylus avellana</i>	März–April	Ältere Triebe bodeneben auslichten. Spitzen verschlanken. Überzählige junge Bodentriebe im Sommer ausreißen (> Felsenbirne)	19
Heckenkirsche <i>Lonicera nitida</i>	März–August	Nur Formschnitte und formale Hecken jährlich schneiden. Als Bodendecker alle 5–7 Jahre stark auslichten (> Buchs, Formen)	28
Heidelbeere <i>Vaccinium corymbosum</i>	März–April	Schnitt im Frühjahr, etwa 10 vitale Gerüsttriebe. Einjährige Lang- und Seitentriebe als Fruchtholz fördern. Verzweigungen auslichten.	59
Heiligenkraut <i>Santolina</i> -Arten	April–Mai Juli	Jährlich beim Austrieb stark einkürzen. Nur im beblätterten Bereich schneiden. Nach der Blüte halbkugelig formieren (> Lavendel)	24
Hibiskus, Eibisch <i>Hibiscus syriacus</i>	März–April	Jährlich vor dem Austrieb. Mit 4–7 Gerüsttriebe erziehen. Seitentriebe im oberen Bereich auf 5 cm, im unteren auf 10 cm kürzen	23
Himbeere (Frühsommer) <i>Rubus idaeus</i>	Februar–März Juni–August	Schnitt jährlich. Abgeerntete Ruten im Sommer bodeneben entfernen. 10 neue Ruten pro Meter anbinden, übrige entfernen	57
Himbeere (Spätsommer) <i>Rubus idaeus</i>	Februar–März	Schnitt jährlich im Frühjahr. Dabei werden alle Ruten bodeneben entfernt. Neue Ernte an diesjährigen Ruten	56
Holunder <i>Sambucus nigra</i>	März–April	Schnitt jährlich im Frühjahr. Stabiles Gerüst bleibt erhalten. Einjährige Triebe fördern (> zwischen Felsenbirne und Zaubernuss)	19
Hortensien <i>Hydrangea</i> -Arten	März	Die meisten Arten jährlich im Frühjahr vor dem Austrieb schneiden. Der Schnitt muss je nach Art und Blütezeit unterschiedlich erfolgen	20

Name <i>Botanischer Name</i>	Schnittzeitpunkt	Schnitt	Seite im Heft
Japanische Weinbeere <i>Rubus phoenicolasius</i>	März–April Juli–August	Schnitt jährlich. Abgetragene Ruten im Sommer entfernen. Neue Ruten im Frühjahr auf 3 m einkürzen, Seitentriebe auf Zapfen	56
Johannisbeere, Rote <i>Ribes rubrum</i>	Februar–März Juli	Schnitt jährlich vor dem Austrieb, ergänzend nach der Ernte. 10–12 kräftige Gerüsttriebe. Einjährige Seitentriebe als Fruchtriebe fördern	58
Johannisbeere, Schwarze <i>Ribes nigrum</i>	Februar–März Juli	Schnitt jährlich vor dem Austrieb, ergänzend nach der Ernte. 10–12 kräftige Gerüsttriebe. Einjährige Seitentriebe als Fruchtriebe fördern	58
Jostabeere <i>Ribes x nidrigolaria</i>	Februar–März Juli	Schnitt jährlich vor dem Austrieb, ergänzend nach der Ernte. 10–12 kräftige Gerüsttriebe. Einjährige Seitentriebe als Fruchtriebe fördern	58
Kiefer <i>Pinus</i> -Arten	Mai	Möglichst wenig schneiden. Bei Bedarf junge, noch grüne Austriebe im Frühsommer einkürzen. Ältere Triebe umlenken (> Thuja)	27
Kiwi <i>Actinidia chinensis</i>	März–April Juli–August	Schnitt jährlich im Frühjahr und Sommer. Klares Gerüst erziehen. Fruchtriebe im Sommer auf 1 m, im Frühjahr stark einkürzen	61
Kolkwitzie <i>Kolkwitzia amabilis</i>	Mai–Juni	Schnitt nach der Blüte. Bis zu 10 Gerüsttriebe, diese nach 6–8 Jahren ersetzen. Verzweigungen auf Jungtriebe umlenken (> Forsythie)	18
Lavendel <i>Lavandula</i> -Arten	April–Mai Juli	Jährlich beim Austrieb stark einkürzen. Nur im beblätterten Bereich schneiden. Nach der Blüte bis Anfang August halbkugelig formieren	24
Liguster <i>Ligustrum</i> -Arten	März–August	Formale Hecken im Frühjahr und Sommer schneiden. Frei wachsend vor der Blüte auslichten. Triebspitzen verschlanken (> Hecken)	23
Lorbeer-Kirsche <i>Prunus laurocerasus</i>	März–April	Schnitt nur bei Bedarf. Vor Austrieb überlange Triebe im Innern auf Seitentriebe umlenken. Starker Schnitt möglich (> Rhododendron)	26
Mandelbäumchen <i>Prunus triloba</i> 'Plena'	April–Mai	Schnitt nur nach der Blüte. Verblühte Triebe auf kurze Zapfen bis an das Gerüst einkürzen. Im Sommer kranke Triebe entfernen.	-
Perückenstrauch <i>Cotinus cogygia</i>	März–April	Schnitt bei Bedarf vor dem Austrieb. Stabiles Gerüst bleibt erhalten. Verzweigungen auslichten (> zwischen Felsenbirne und Zaubernuss)	19
Pfeifenstrauch <i>Philadelphus</i> -Arten	März–April Juni	Schnitt jährlich direkt nach der Blüte, Verjüngung vor Austrieb. Gerüsttriebe ersetzen. Einjährige Seitentriebe fördern (> Schneeball)	19
Pfeifenwinde <i>Aristolochia macrophylla</i>	März–April Juni–Juli	Schnitt bei Bedarf im Frühjahr. Ganze Knäuel entfernen. Starker Rückschnitt auf 1 m Höhe möglich	43
Pfirsich <i>Prunus persica</i>	April–Mai Juli–September	Schnitt jährlich ab der Blüte, besser im Sommer. Einjährige „wahre“ Fruchtriebe ab 20 cm fördern, kürzere auf Zapfen entfernen	50
Purpurwein <i>Vitis coignetiae</i>	März–April Juni–Juli	Schnitt jährlich im Frühjahr, bei Bedarf zusätzlich im Sommer. Gerüsttriebe brauchen Rankhilfe. Seitentriebe auf 10 cm einkürzen	43
Quitte <i>Cydonia oblonga</i>	März–April Juli–September	Erziehung im Frühjahr, Erhaltung und Verjüngung bevorzugt im Sommer. Schnitt wie bei Apfel. Auf Feuerbrand achten (> Apfel)	46–47
Ranunkelstrauch <i>Kerria japonica</i>	Mai	Schnitt jährlich nach der Blüte, dreijährige und ältere bodeneben auslichten. Zweijährige verschlanken (> zw. Himbeere und Spiräe)	-
Rhododendron <i>Rhododendron</i> -Arten	April–Mai	Schnitt bei Bedarf im Frühjahr. Verkahlte oder vergreiste Triebe im unteren Bereich auf kurze Zapfen an einer Verzweigung entfernen	26
Rosen (einmal blühend) <i>Rosa</i> -Sorten	März–April Juni–Juli	Schnitt jährlich nach der Blüte. Ältere Triebe bodeneben auslichten, übrige an den Spitzen verschlanken, vergreiste umlenken	37
Rosen (öfter blühend) <i>Rosa</i> -Sorten	März–April Juni–September	Schnitt jährlich vor dem Austrieb. Schnittstärke nach Art verschieden. Starker Schnitt fördert Vitalität und reiche Nachblüte	32–37
Rosmarin <i>Rosmarinus officinalis</i>	April–Mai	Schnitt jährlich direkt nach der Blüte. Triebe bodennah auf Seitenknospen einkürzen, nur einige einjährige ganz belassen	25
Säckelblume <i>Ceanothus x delilianus</i>	April–Mai	Schnitt jährlich vor dem Austrieb. Zweijährige und ältere Triebe bodeneben entfernen, einjährige auf 10 cm einkürzen (> Bartblume)	25
Sauerkirsche <i>Prunus cerasus</i>	März Juli–September	Erziehungsschnitt vor Austrieb, jährlicher Erhaltungsschnitt im Sommer. Einjährige Fruchtriebe fördern, ältere auf Zapfen einkürzen	50

Name <i>Botanischer Name</i>	Schnittzeitpunkt	Schnitt	Seite im Heft
Scheinquitte, Zierquitte <i>Chaenomeles</i> -Arten	April–Mai	Schnitt nach der Blüte. Bodentriebe nach 5 Jahren ersetzen. Triebspitzen verschlanken oder umlenken (> Schneeball)	19
Scheinzypresse <i>Chamaecyparis</i> -Arten	April–Juli	Schnitt, wenn unvermeidlich, im Frühjahr bis Sommer. Nur im benadelten Bereich schneiden. Form erhalten (> Thuja und Hecken)	27 28
Schlangenwein <i>Akebia quinata</i>	April–Mai Juli–August	Schnitt bei Bedarf im Frühjahr nach der Blüte. Ganze Knäuel entfernen. Starker Rückschnitt auf 1 m Höhe möglich.	42
Schlingknöterich <i>Fallopia baldschuanica</i>	März Juli–August	Schnitt bei Bedarf im Frühjahr. Ganze Knäuel entfernen. Starker Rückschnitt auf 1 m Höhe möglich (> Pfeifenwinde)	43
Schneeball <i>Viburnum</i> -Arten	März–Juni	Im Frühjahr blühende Arten nach der Blüte schneiden. Gerüst stabil. Verzweigungen der Triebspitzen regelmäßig verjüngen	19
Schneeheide (Winter) <i>Erica carnea</i>	März–April	Schnitt jährlich nach der Blüte. Ganze Pflanze um mindestens die Hälfte im beblätterten Bereich einkürzen (> Lavendel im Frühjahr)	24
Sommerflieder <i>Buddleja davidii</i>	März–April	Schnitt jährlich vor dem Austrieb. Gerüst kurz halten. Einjährige Triebe auf kurze Zapfen einkürzen, vergreiste umlenken	23
Spindelstrauch <i>Euonymus</i> -Arten	März–Mai	Schnitt nur bei Bedarf. Gerüst langlebig. Nach innen wachsende Triebe entfernen. Verzweigungen auslichten (> Zaubernuss)	19
Spiräe (Frühjahr) <i>Spiraea</i> -Arten	April–Mai	Schnitt jährlich nach der Blüte. Gerüsttriebe nach 3–6 Jahren ersetzen. Spitzen regelmäßig verschlanken oder auf Jungtriebe umlenken	18
Spiräe (Sommer) <i>Spiraea</i> -Arten	März	Jährlich zweijährige und ältere Triebe bodeneben auslichten. Einjährige um mindestens die Hälfte einkürzen (> Fünffingerstrauch)	23
Stachelbeere <i>Ribes uva-crispa</i>	Februar–März Juli	Schnitt jährlich vor dem Austrieb, ergänzend nach der Ernte. 10–12 kräftige Gerüsttriebe. Einjährige Seitentriebe als Fruchttriebe fördern	59
Süßkirsche <i>Prunus avium</i>	März–April Juli–September	Erziehungsschnitt jährlich im Frühjahr, Erhaltung und Verjüngung bei Bedarf im Sommer. Wichtig: Gute Belichtung im Kroneninnern!	49
Thuja <i>Thuja</i> -Arten	März–Juli	Schnitt, wenn unvermeidlich, im Frühjahr bis Sommer. Nur im benadelten Bereich schneiden. Form dabei erhalten (> Hecken)	27 28
Thymian <i>Thymus</i> -Arten	Juni–Juli	Schnitt nach der Blüte, aber bis Anfang August. Nur im beblätterten Bereich. Nicht ins alte Holz schneiden. Halbkugelige Form	25
Trompetenwinde <i>Campsis</i> -Arten	März–April	Schnitt jährlich im Frühjahr. Gerüst definieren, an Rankhilfe anbinden. Seitentriebe auf Zapfen mit 2 Knospenpaaren einkürzen	39
Wacholder <i>Juniperus</i> -Arten	März–Juli	Schnitt bei Bedarf im Sommer. Lange Triebe auf benadelte, kürzere Seitentriebe umlenken. Nicht ins alte, unbenadelte Holz schneiden	27
Walnuss <i>Juglans regia</i>	Juli–September	Schnitt nur im Sommer bei Bedarf. In der Erziehung Steiltriebe entfernen. Übermäßige Spitzenverzweigungen auslichten (> Bäume)	30
Weide <i>Salix</i> -Arten	März–Mai	Schnitt jährlich nach der Blüte. Gerüst langlebig. Einjährige Triebe fördern. Bei Kopfweiden einjähr. Triebe auf kurze Zapfen am Kopf	-
Weigelle <i>Weigela</i> -Arten	März–Juni	Schnitt regelmäßig vor dem Austrieb. Gerüsttriebe nach 4 Jahren ersetzen. Blüte an einjährigen und diesjährigen Trieben (> Forsythie)	18
Weinrebe, Tafeltraube <i>Vitis vinifera</i> ssp. <i>sativa</i>	März–April Juli–August	Schnitt jährlich im Frühjahr und Sommer. Langlebige Gerüsttriebe an Rankhilfe. Fruchttriebe im Frühjahr auf 2 Knospen einkürzen.	60–61
Wilder Wein <i>Parthenocissus quinquefolia</i>	März–August	Schnitt bei Bedarf ab Frühjahr. Dachtraube und Fensteröffnungen frei schneiden. Überhängende Triebe dämpfen Wachstum	43
Zaubernuss <i>Hamamelis</i> -Arten	März–April	Schnitt bei Bedarf nach der Blüte. Gerüst über Jahre vital. Nur nach innen wachsende Triebe oder Verzweigungen maßvoll auslichten	19
Zierapfel <i>Malus</i> -Arten	Februar–Mai Juli–August	Schnitt bei Bedarf nach der Blüte. Gerüsttriebe jahrelang stabil. Vergreiste, überhängende Spitzen lichten (> Felsenbirne, Zaubernuss)	19
Zwetschge und andere <i>Prunus domestica</i>	Februar–Mai Juli–August	Erziehung und Erhaltung jährlich im Frühjahr. Verjüngung im Sommer. Zweijährige Fruchttriebe fördern. Große Wunden vermeiden	48